

LES INSECTES



Criquet ensanglanté

Caloptéryx éclatant

Libellule au corps bleu à vert métallique. Ailes des mâles partiellement bleues. Vole au bord de l'eau De mai à septembre Canaux, Brionneau.

Criquet ensanglanté

Grand criquet vert à brun olive. Les fémurs des pattes arrières sont bordés de rouge-sang. Présent en été Prairies, fossés du marais.

Orthétrum réticulé

Libellule au corps gris-bleu (mâle) ou jaune noir (femelle). Se pose sur les pierres et les allées. Vole de mai à septembre Brionneau et allées proches de l'eau.

Petit mars changeant

Grand papillon aux reflets bleus ou violets chez le mâle. La chenille se nourrit des feuilles de saule blanc. Vole en juillet Saulaie, marais.



Orthétrum réticulé



Petit mars changeant

LES PLANTES

Baldingère

Grande plante vivace. Feuilles larges rudes. Floraison jaune-verdâtre en panicule. Marais, prairies, saulaie.



Baldingère

Butome en ombelle

Grand plante vivace. Feuilles linéaires tranchantes. Fleurs rose pâle en ombelle. Floraison : mai à août Fossés du marais et des prairies.



Butome en ombelle

Consoude officinale

Plante vivace. Grandes feuilles pointues couvertes de poils raides. Fleurs rosée à pourpre. Floraison : mai Marais, prairies.



Consoude officinale

Frêne oxyphyllé

Arbre pouvant atteindre 40 m de haut. Feuilles composées. Bourgeon brunâtre. Floraison en fin d'hiver. Boissements.



Frêne oxyphyllé

Grande lysimaque

Plante vivace. Feuilles sans pétiole. Fleurs jaunes en inflorescences pyramidales. Floraison : juin à août. Marais, prairies.



Grande Lysimaque

Guimauve officinale

Grande plante vivace. Feuilles grisâtres épaisses, veloutées au toucher. Fleurs rosées. Floraison : juin à septembre. Marais, prairies.



Guimauve officinale

Inule britannique

Plante vivace poussant par plaques. Feuilles embrassant légèrement la tige. Fleurs jaunes au « cœur » orange. Floraison : juillet. Fossés du marais et prairies.



Inule britannique



Iris faux-acore

Iris faux-acore

Plante vivace. Feuilles larges en forme de glaive. Grandes fleurs jaunes. Floraison : avril à juin. Fossés du marais et des prairies, rives des canaux et du Brionneau.



Pigamon jaune

Pigamon jaune

Plante vivace. Feuilles à 2-3 folioles. Fleurs jaunâtres en inflorescences. Floraison : juin à août. Marais, prairies.



Sagittaire ou flèche d'eau

Sagittaire ou flèche d'eau

Plante aquatique vivace Feuilles dressées hors de l'eau en forme de flèche. Fleurs blanc rosé. Floraison : été Marais.



Salicaria commune

Salicaria commune

Plante vivace à tige quadrangulaire. Feuilles étroites en forme de fer de lance. Fleurs rouge violacé formant un long épi. Floraison : juin à septembre Fossés du marais et des prairies, rives des canaux et du Brionneau.



Saule blanc

Saule blanc

Arbre de 6 à 25 m de haut. Feuilles lancéolées blanc soyeux surtout sur la face inférieure. Floraison : printemps. Saulaie.



Scirpe maritime

Scirpe maritime

Plante vivace. Tiges triangulaires. Feuilles longues et étroites. Fleurs brunâtres. Floraison : juin à septembre. Fossés proches des prairies.

LA GESTION DU PARC

Depuis plusieurs années la Ligue pour la protection des oiseaux et la direction Parcs et jardins de la Ville d'Angers travaillent ensemble afin que les aménagements et la gestion du parc favorisent la faune et la flore naturelles.

À ce titre, la LPO a délivré l'agrément « Refuge LPO » au parc de Balzac depuis 2006.

Exemples :
La gestion dans le marais, les prairies et la saulaie

La fauche et le pâturage

des prairies s'effectuent le plus tardivement possible (fin juin début juillet) pour que le râle des genêts puisse nicher. La fauche est centrifuge, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur de la parcelle, pour permettre aux oiseaux de fuir et de ne pas se faire happer par la machine.



Les grosses branches et les arbres morts sont conservés sur place, en tas. Le bois mort est recherché par les insectes xylophages (mangeurs de bois) comme site de reproduction. Les pics viennent se nourrir dans le bois mort des larves d'insectes xylophages.



i INFOS
Ville d'Angers - Direction Parcs et jardins
20, boulevard Lavoisier
49045 Angers
Tél. 02 41 22 53 00
www.angers.fr


Faune et flore au parc Balzac

Refuge LPO
Jardin d'oiseaux
Formule COLLECTIVITÉ (2013-2018)



MA VILLE
+ J'Y VIS
+ ELLE ME SOURIT

OÙ OBSERVER LA FAUNE ET LA FLORE ?



Légende

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ① LA PROMENADE Yolande d'Aragon | ⑦ LA CHENAIE |
| ② LE MARAIS | ⑧ LES BOIS DE COULEURS |
| ③ LES BASSES PRAIRIES | ⑨ LES CHAMPS FLEURIS |
| ④ LES DUNES ET VAGUES VERTES | ⑩ LES COULOIRS DE GRAMINÉES |
| ⑤ LE VERGER AUX OISEAUX | ⑪ LA SAULAIE |
| ⑥ LES JARDINS FAMILIAUX | |



La saulaie

Mésanges, pouillots, fauvettes, merles, grives, grimpeaux, pics à observer.



Marais et basses prairies

Rôle des genêts à écouter en soirée et la nuit de mai à début juillet. Tarier des prés, bruant des roseaux, Cisticole des joncs à observer au printemps et en été.



Le Brionneau (de la saulaie à la Maine)

et fossés bord du pâturage Martin-pêcheur, bergeronnettes grises et des ruisseaux, héron cendré, aigrette garzette, gallinule-poule d'eau, canard colvert, à observer toute l'année.



Marais et basses prairies

Canard colvert, aigrette garzette, héron cendré, mouette rieuse à observer en automne et en hiver lors des inondations.

LES OISEAUX

Aigrette garzette

Échassier blanc, pattes noires, doigts jaunes. Présente toute l'année. Marais, canaux et Brionneau.



Aigrette garzette

Héron cendré

Échassier gris, bec jaune. Présent toute l'année. Marais, prairies, canaux et Brionneau.



Héron cendré

Canard colvert

Palmipède au corps allongé. Mâle : tête vert bouteille, poitrine marron, corps gris. Femelle : corps brunâtre tacheté de brun foncé. Présent toute l'année. Canaux, Brionneau, prairies et marais inondés en hiver.



Canard colvert

Rôle des genêts

Taille d'une poule d'eau. Corps brun tacheté de noir. Très rare et difficile à observer mais chante la nuit (mai à juillet) dans les hautes herbes. Présence potentielle d'avril à août. Marais, prairies. La dernière observation date de 2004.



Rôle des genêts

Gallinule poule-d'eau

Plus petite que la foulque et plus discrète. Bec rouge et jaune. Flancs avec une ligne blanche. Queue bordée de blanc. Présente toute l'année sur les rives. Canaux et Brionneau.



Gallinule poule-d'eau

Foulque macroule

Bec et front blancs. Tête noire, corps ardoisé. Présente surtout en hiver. Prairies et marais inondés.



Foulque macroule

Mouette rieuse

Corps blanc, ailes grises, tête marron (février à juillet) Présente surtout en hiver. Prairies et marais inondés.



Mouette rieuse

Martin-pêcheur d'Europe

Petit oiseau bleu et orangé. Bec pointu. Cris perçants. File au ras de l'eau. Présent toute l'année. Brionneau, canaux.



Martin-pêcheur d'Europe



Bergeronnette grise

Bergeronnette grise

Blanc, noir et gris, longue queue. Hoche la queue. Présente toute l'année. Rives du Brionneau et des canaux, zones herbeuses rases.



Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette des ruisseaux

Tête et dos gris, ventre jaune. Longue queue. Hoche la queue. Présente toute l'année. Rives du Brionneau et des canaux.



Pigeon ramier

Pigeon ramier

Corps gris, poitrine rosée, tache blanche au cou. Présent toute l'année. Boiselements du parc, se nourrit en bandes dans le marais.



Pic épeiche

Pic épeiche

Plus petit que le pic vert. Bec puissant. Corps noir et blanc, bas ventre rouge. Grimpe le long des arbres. Présent toute l'année. Boiselements.



Pic vert

Pic vert

Plumage vert, calotte rouge. Bec puissant. Grimpe le long des arbres et se nourrit également au sol. Chant ricanant. Vol onduleux. Présent toute l'année. Boiselements et pelouses.



Grimpereau des jardins

Grimpereau des jardins

Petit passereau. Long bec fin courbé. Dessus brun, ventre blanc. Grimpe le long des troncs. Présent toute l'année. Boiselements.



Troglodyte mignon.

Troglodyte mignon

Petite boule marron, queue dressée. Bec effilé. Présent toute l'année. Boiselements.



Rouge-gorge familier

Rouge-gorge familier

Corps rondet. Dessus brun-olive. Gorge orange. Présent toute l'année. Boiselements.

Tarier des prés

Petit passereau de prairies. Dessus brun foncé. Sourcils blanc net. Gorge orange. Rare. De passage au printemps. Marais, prairies.



Tarier des prés

Grive draine

Taille d'un merle. Brun gris dessus, dessous tacheté de noir. Vol onduleux. Présente toute l'année. Boiselements, herbes rases.



Grive draine

Merle noir

Mâle : noir avec le bec jaune. Femelle : brun terne. Très commun. Présent toute l'année. Boiselements, herbes rases.



Merle noir

Etourneau sansonnet

Taille d'un merle. Plumage sombre moucheté. Souvent en groupes. Présent toute l'année. Boiselements et zones d'herbes rases.



Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Passereau des sous-bois. Corps gris, bec effilé. Mâle : calotte noire. Femelle : calotte brune. Présente toute l'année. Boiselements.



Fauvette à tête noire

Cisticole des joncs

Petit passereau des marais. Dessus brun clair rayé de noir. Chante en vol « tsiip-tsiip ». Présent toute l'année. Marais, prairies.



Cisticole des joncs

Pouillot véloce

Corps brun-olive. Se déplace dans le feuillage des arbres. Présent toute l'année. Boiselements.



Pouillot véloce

Pie bavarde

Bec massif. Corps noir et blanc. Longue queue. Présente toute l'année. Au sol et dans les arbres.



Pie bavarde



Geai des chênes

Geai des chênes

Taille d'un petit pigeon. Corps brun rosé, moustaches noires, queue noire, croupion blanc, coin des ailes bleu. Présent toute l'année. Boiselements.



Mésange bleue

Mésange bleue

Petite mésange. Tête, ailes, queue et pattes bleues. Ventre jaune. Présente toute l'année. Boiselements.



Mésange charbonnière

Mésange charbonnière

Tête noire, joues blanches, ventre jaune avec cravate noire. Présente toute l'année. Boiselements.



Mésange nonnette

Mésange Nonnette

Petite mésange. Dessus brun pâle, calotte et petite bavette noires. Présente toute l'année. Boiselements humides (saulaie).



Pinson des arbres

Pinson des arbres

Ailes avec 2 bandes blanches. Mâle : tête grise, poitrine rougeâtre. Femelle : brune. En bande l'hiver. Présent toute l'année. Boiselements et zones d'herbes rases.



Chardonneret élégant

Chardonneret élégant

Taille d'un pinson. Bec conique. Tête rouge, blanche et noire. Bande jaune sur l'aile. Présent toute l'année. Boiselements et zones herbeuses.



Bruant des roseaux

Bruant des roseaux

Passereau des zones humides. Taille d'un pinson. Dessus brun rayé de noir. Mâle : tête et bavette noires. Femelle : tête brune. Présent au printemps et en été. Marais et prairies.